

Vacuna	Protege contra	Edad	Dosis	Vía y sitio de administración	Fecha	Sello y firma	Lote	
<b>BCG</b>	Formas graves de tuberculosis: Meningitis tuberculosa Tuberculosis miliar	Menores de 1 año (con énfasis en el recién nacido)	Única	Intradérmica <i>Tercio superior de la región deltoidea del brazo derecho</i>				
<b>Rotavirus</b>	Diarreas por rotavirus. (Previene la deshidratación severa y complicaciones)	2 meses	1°	Oral				
		4 meses	2°					
<b>OPV (Sabin Oral)</b>	Poliomielitis o Parálisis Infantil	2 meses	1°	Oral (2 gotas)				
		4 meses	2°					
		6 meses	3°					
		18 meses	primer refuerzo					
		4 años	segundo refuerzo					
<b>Pentavalente (DPT + HB + Hib)</b>	Difteria Tétanos Tos ferina Hepatitis B Meningitis Neumonía Otras enfermedades por Hib	2 meses	1°	Intramuscular <i>Cara anterolateral externa del muslo, lado derecho</i>				
		4 meses	2°					
		6 meses	3°					
<b>Neumococo</b>	Meningitis Neumonías Otras enfermedades invasivas producidas por Neumococo	2 meses	1°	Intramuscular <i>Cara anterolateral externa del muslo, lado izquierdo</i>				
		4 meses	2°					
		12 meses	Refuerzo					
		adultos mayores * (60 años y más)	1 dosis con intervalo de 3 a 5 años		* Intramuscular <i>Brazo derecho o izquierdo</i>			
		enfermos crónicos * (todas las edades)	1 dosis con intervalo de 3 a 5 años					

Vacuna	Protege contra	Edad	Dosis	Vía y sitio de administración	Fecha	Sello y firma	Lote
SPR	Sarampión Paroditis (paperas) Rubéola	12 meses	1°	Subcutánea Brazo Izquierdo			
		4 años	Refuerzo				
DPT	Difteria Tétanos Tos ferina	18 meses (o un año después de la 3° dosis de penta)	Primer refuerzo	Intramuscular <i>Cara anterolateral externa del muslo, lado derecho (18 meses)</i>			
		4 años	Segundo refuerzo	Brazo derecho (4 años)			
AA	Fiebre amarilla	18 meses	Única	Subcutánea Brazo derecho			
		Sin antecedentes	Adultos * (hasta 59 años)	* Subcutánea Brazo derecho o izquierdo			
Anti-Influenza estacional	Complicaciones por influenza	6 a 17 meses	2 dosis con intervalo de 1 mes	Intramuscular <i>Cara anterolateral externa del muslo</i>  * Intramuscular <i>Brazo derecho o izquierdo</i>			
		18 a 23 meses	1 dosis				
		24 a 35 meses	1 dosis				
		adultos mayores * (60 años y más)	1 dosis cada año				
		enfermos crónicos * (todas las edades)	1 dosis cada año				
		Embarazadas*	1 dosis cada año				
		Trabajadores de la salud*	1 dosis cada año				
		Trabajadores de servicios esenciales*	1 dosis cada año				
Td	Tétanos Difteria	10 años	1 dosis según antecedentes con DPT/Penta	Intramuscular <i>Brazo derecho o izquierdo</i>			
		Otras edades y embarazadas*	Según antecedentes con DPT/Penta				