

CITOL LAGRIMAS ® ARTIFICIALES

Composición:

Cada mL (30 gotas) contiene Fosfato disódico anhidro 8,75 mg; Fosfato monosódico 2H₂O 1,13 mg; Povidona K30 15,00 mg; Cloruro de sodio 4,20 mg; Excipientes: Timerosal y otros.

Mecanismo de acción:

Las lágrimas artificiales actúan reemplazando las lágrimas verdaderas, es decir suavizan, protegen y lubrican los ojos, permitiéndole al paciente mejorar significativa-mente su salud ocular. Además, la formulación presenta un pH y osmolaridad compatibles con los tejidos oculares que crea una capa de protección deslizante sobre la superficie inflamada e irritada del ojo y estabiliza el líquido lagrimal.

Farmacocinética:

Debido al alto peso molecular de sus componentes es prácticamente imposible que este producto atraviese la membrana de epitelios y mucosas oculares y sea absorbido a nivel sistémico. Su acción es exclusivamente local.

Indicaciones:

Previene la sequedad corneal y conjuntival causada por una inadecuada producción de lágrimas factores ambientales como el smog, el polvo, el viento o por el uso de lentes de contacto. Es una solución acuosa, elaborada bajo las máximas condiciones de asepsia para uso oftálmico, con un pH compatible con los tejidos oculares, con mínimas posibilidades de irritación.

Posología:

Dosis: Aplicar 2 gotas cada vez que se requiera lubricar el ojo. La frecuencia de aplicación y el tiempo de uso quedan a criterio del médico para cada situación. Información para portadores de lentes de contacto: En caso de utilizar lentes de contacto se debe aplicar las lágrimas artificiales con frecuencia para mantener la humectación de los ojos.

Modo de uso:

Instilar en el borde interno del ojo y parpadear suavemente, secar el remanente con un pañuelo descartable. Cuidar de no tocar el pico dosificador con ninguna superficie.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Reacciones adversas:

Esta formulación es muy bien tolerada. Ocasionalmente podría producir una ligera irritación y escozor que desaparecen con el uso continuado.

Precauciones y advertencias:

Evitar que la punta del gotero toque el ojo. Cerrar el frasco inmediatamente después de usarlo. Cuidar siempre la higiene de manos antes de realizar la aplicación. Si, luego de varios días del uso continuado, persistiera la irritación, se recomienda consultar al oftalmólogo.

Restricciones de uso:

Este producto deberá utilizarse en forma restringida en pacientes que presenten síntomas de ojo seco de etiología no aclarada, para evitar retrasos en el diagnóstico y de un eventual tratamiento de base.

Interacciones:

Ninguna conocida hasta la fecha. En caso de otro tratamiento ocular local, se debe observar un intermedio mínimo de 5 minutos entre las aplicaciones. Citol lágrimas artificiales siempre debe ser la última medicación instilada

Sobredosis:

No se han reportado casos de sobredosis. En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en Emergencias Médicas sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Tel.: 220 418.

Presentación:

Caja conteniendo 1 frasco gotero de 10 mL.

**Almacenar a temperatura ambiente
(inferior a 30°C).**

Mantener fuera del alcance de los niños.



OFTALMICA

Elaborado por Laboratorio de Productos ETICOS C.E.I.S.A.
División Oftálmica. Atilio Galfre N° 151 y Calle 1 San Lorenzo, Paraguay
Tel.: (595-21) 521 390 (R.A.) Fax: (595-21) 521 389
laboratorio@eticos.com.py - www.eticos.com.py
D.T.: Q.F. Myriam Cabriza de Paredes - Reg. N° 2837
Autorizado en Paraguay por el M.S.P. y B.S.