

SUSPENSIÓN ORAL / VÍA ORAL
VENTA BAJO RECETA

MultiPROB[®] AB-Digest

SUPLEMENTO DIETARIO

Pediococcus pentosaceus CECT 8330

Bifidobacterium longum CECT 7894

Lactobacillus rhamnosus ATCC 53103

Zinc, Inulina/FOS.

Fórmula (Propiedad de AB-BIOTICS SA):

Cada frasco de 10 mL contiene: 6x10⁹ ufc *Pediococcus pentosaceus* CECT 8330, *Bifidobacterium longum* CECT 7894 y *Lactobacillus rhamnosus* ATCC 53103; Zinc 5mg; Inulina/FOS 1000mg; Excipientes c.s.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción: 1 frasco de 10 mL		
Porciones por envase: 1 porción		
Cantidad	Por 100 g	Por porción
Kcal	104,00 kcal	11,86 kcal
KJ	439 kJ	50,05 kJ
Proteínas	0,23 g	0,03 g
Grasas (Lípidos)	0,43 g	0,05 g
Carbohidratos De los cuales:	21,02 g	2,40 g
Azúcares	20,7 g	2,36 g
Fibra dietética	7,7 g	0,88 g
Sodio	15,6 mg	1,8 mg
Zinc	48,2 mg	5,0 mg
Probiótico	5,3x10 ⁹ ufc	6x10 ⁹ ufc
Prebiótico	9,228 g	1052 mg

"El porcentaje de valores diarios está basado en una dieta de 2000 kcal. Sus valores diarios pueden ser más altos o bajos dependiendo de sus necesidades calóricas".

Usos y Propiedades:

Este producto es una mezcla de 3 cepas probióticas: *Bifidobacterium longum*, *Pediococcus pentosaceus* y *Lactobacillus rhamnosus*, los cuales contribuyen a:

- La estimulación del crecimiento de bacterias beneficiosas
- El refuerzo de la barrera intestinal
- El fortalecimiento del sistema inmune

Además de los probióticos, esta fórmula incluye el zinc, que también contribuye a promover el sistema inmune; y la Fos/Inulina, que se introdujo como fuente de la microflora comensal con su correspondiente efecto en toda la salud gastrointestinal.

Posología:

Vía Oral.

Este producto está indicado para lactantes, niños y adultos.

La dosis recomendada es de 1 frasco/día, ingerido preferiblemente después del desayuno. Para un mejor resultado, se recomienda su administración durante un periodo de 4 a 6 semanas.

Modo de preparación:

1. Apretar firmemente el tapón dosificador con la palma de la mano.
2. Esperar a que el contenido caiga en el frasco.
3. Agitar antes de tomar.
4. Desenroscar el tapón dosificador y beber la suspensión.

5. También se puede añadir a Líquidos o bien en alimentos semisólidos.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad conocida a los probióticos o a alguno de los excipientes. Sistema inmunitario debilitado. Enfermedades autoinmunes. Pacientes trasplantados tratados con inmunosupresores.

Reacciones Adversas:

Los efectos secundarios que pueden presentarse durante el uso de este suplemento dietario y que son comunes a la mayoría de los probióticos incluyen náuseas, vómitos, formación de gases y cólicos leves.

Estos efectos desaparecen generalmente después de unos días de iniciada la administración. Si por el contrario persisten, se debe suspender el consumo y consultar con el médico.

Precauciones y Advertencias:

No se debe superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los suplementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida sano. Este producto se debe conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa. Se debe mantener fuera del alcance de los niños.

Se debe tener precaución para su administración en las siguientes poblaciones, debido al riesgo de sufrir complicaciones potenciales derivadas del uso de probióticos. En estos casos, un médico debe valorar de forma individualizada el riesgo-beneficio del probiótico en cuestión antes de tomarlo:

-Pacientes con enfermedades de base muy graves, cirugía cardíaca reciente, en la Unidad de Cuidados Intensivos o en período de convalecencia.

-Pacientes intervenidos quirúrgicamente.

-Pacientes que tienen un mayor riesgo de que los probióticos se absorban a través del intestino y pasen a la sangre (abdomen agudo, fuga intestinal, barrera intestinal debilitada, quimioterapia y radioterapia).

-Pacientes con disfunción pancreática.

-Administración de probióticos por yeyunostomía.

Uso durante el embarazo y la lactancia:

La toma de suplementos alimenticios durante el embarazo y la lactancia debe hacerse siempre bajo recomendación médica.

Excipientes:

-Este producto contiene maltodextrina. Su consumo excesivo puede producir efectos adversos, como aumento de la glicemia, aumento de peso, reacciones alérgicas con erupciones cutáneas y dificultad para respirar, así como trastornos gastrointestinales.

-Este producto contiene fructosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa (HFH), problemas de absorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento.

-Este producto contiene pequeña cantidad de sodio, por lo que puede considerarse exento de sodio.

Interacciones:

-No se han registrado interacciones de significancia clínica. Sin embargo, se debe evitar administrar este producto con otras vitaminas y suplementos de hierbas, ya que podría aumentar el riesgo de efectos secundarios, o hacer que el medicamento no funcione correctamente.

-Administración simultánea de probióticos con antibióticos: cuando el probiótico contiene en su composición una o más bacterias, hay que separar su toma del antibiótico como mínimo 2 horas para que el antibiótico no interfiera con las bacterias beneficiosas.

Sobredosis:

El aumento significativo de bacterias en el intestino, producto del consumo excesivo de probióticos, puede producir síntomas de desorientación, confusión mental y dificultad para concentrarse, así como sensación de gases y distensión abdominal severa. Si aparecen estos síntomas, se debe suspender la administración y recurrir a un centro asistencial. En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en Emergencias Médicas sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro Mongelós, Asunción, Paraguay. Tel.: (595-21) 220 418.

Presentación:

Caja conteniendo 7 frascos de 10 mL conteniendo diluyente y tapón de suministro conteniendo 200 mg de polvo para suspensión oral.

Almacenar a temperatura controlada (inferior a 25°C), en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

No exceder la dosis diaria recomendada.

"Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento, o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de embarazo, lactancia o niños, consultar a su médico antes de consumir este producto".



Producto licenciado por
AB-BIOTICS

Elaborado por: Biofarma S.R.L., Via Castelliere, 2, 33036 Mereto di tomba (UD), Italia.
Importado y acondicionado por: Laboratorio de Productos ETICOS C.E.I.S.A. Atilio Galfre N° 151 y Calle 1 San Lorenzo, Paraguay - Tel.: (595-21) 521 390 (R.A.) laboratorio@eticos.com.py - www.eticos.com.py
D.T.: Q.F. Rosario Paradies - Reg. N° 4.584.
Bajo Licencia de: AB-Biotics S.A., Av. Torre Blanca, 57, Edificio Esade Creapolis 08172, St. Cugat del Vallés, Barcelona, España.
Autorizado en Paraguay por la DINAVISA.